

CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE aux stades 77 (81) (grappes fermées – (véraison)) : Maladies, Vers de la grappe, Cicadelle verte, ...

(d'après les fiches techniques Viticulture d'Agroscope et le Guide Viti d'Agroscope)

Méthode de contrôle	Organismes recherchés	Seuil de tolérance	Stratégie
<ul style="list-style-type: none"> Prélever 25 grappes. Egrainer les grappes et chercher les pénétrations de vers dans les baies (tache brun-violacée accompagnée d'une petite perforation). En cas de pénétration, soulever délicatement la peau du grain à l'aide d'une pointe de couteau et déterminer la larve éventuelle. Noter le nombre total de pénétrations et de larves vivantes de chaque espèce. 	<p><u>Eudémis</u> : tête couleur miel, corps fin, beige clair.</p> <hr/> <p><u>Cochylis</u> : tête foncée, corps dodu et brun foncé</p>	<p>Lutte curative si plus de 5% des grappes sont occupées par un ver.</p>	<p>En cas de dépassement de seuil, traiter au plus vite avec un produit à effet curatif (c.f. Index phytosanitaire Agroscope).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Prélever 50 feuilles (1 feuille par cep) dans le tiers supérieur de la végétation. Noter le nombre total d'individus (formes larvaires) observés. 	<p><u>Cicadelle verte</u></p>	<p>150 à 300 formes larvaires par 100 feuilles selon le cépage et le système de culture.</p>	<p>Privilégier avant tout les mesures culturales visant à compenser les dégâts occasionnés (grande hauteur de feuillage). En cas de dépassement de seuil, intervenir avec un insecticide.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lors du contrôle des ravageurs sur les 25 grappes et les 50 feuilles, observer également les traces d'oïdium. Noter le nombre de grappes et le nombre de feuilles avec symptômes d'oïdium. 	<p><u>Oïdium</u></p>	<p>Pas de seuil de tolérance, car la lutte est préventive.</p>	<p><u>En absence de symptôme</u> : possibilité de stopper les traitements dès le début de la véraison. <u>En présence de symptôme</u> : effectuer un poudrage avec du soufre (25 kg/ha) en conditions favorables (température supérieure à 25°C, bonne luminosité et absence de précipitations les jours suivants). Le soufre mouillable et les fongicides du groupe des pipéridines montrent également un certain effet curatif. <u>Le cuivre en « traitement de couverture »</u> montre une efficacité intéressante aussi contre l'oïdium.</p>
<ul style="list-style-type: none"> En traversant la parcelle, estimer visuellement la pression de mildiou sur feuilles et sur grappes. Quantifier le mildiou sur une échelle de 0 à 4 (0=aucun symptôme, 1= rares symptômes, 2= symptômes régulièrement observés, 3= symptômes très fréquents, 4= symptômes présents sur presque tous les organes). 	<p><u>Mildiou</u></p>	<p>Pas de seuil de tolérance, car la lutte est préventive.</p>	<p><u>En fin de saison</u>, il est important de protéger les nouvelles pousses qui participent grandement à la maturation du raisin. Sur les cépages à maturation tardive, il est intéressant d'effectuer un traitement de couverture avec un produit cuprique.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rechercher activement les ceps atteints d'Esca et noter leur nombre total observé sur la parcelle. 	<p>Esca</p>	<p>Pas de seuil de tolérance</p>	<p>Marquer les ceps malades, les arracher et les éliminer par le feu dès que possible, mais au plus tard avant la prochaine campagne de taille. S'il y a stockage des souches après arrachage, le faire à l'abri de la pluie et en dehors du vignoble.</p>

Liens internet :

Ensemble des résultats de contrôles

www.vitival.ch > Contrôles de saison

Liste des produits de traitement

www.agrometeo.ch > Viticulture > Documents > Index phytosanitaire Agroscope

Communiqués phytos

www.vs.ch/agriculture ou sur abonnement (027 606 76 20)

Informations mildiou

www.agrometeo.ch

CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE aux stades 77 (81) (grappes fermées – (véraison)) : Maladies, Vers de la grappe, Cicadelle verte, ...

GRUPE VITIVAL + Secteur contrôlé :

Date :

Technicien :

PARCELLE Nom du producteur, Cépage, Lieu – dit, Système de culture	Phéno- logie	Nbre d'organes contrôlés	VERS DE LA GRAPPE				CICADEL- LES	AUXILIAIRES (Araignées, Chrysopes, Coccinelles...)	MALADIES		REMARQUES
			Oeufs	Eudémis (larve)	Cochylis (larve)	Pénétration vide			OIDIUM	MILDIOU	
<i>Exprimer les dégâts en</i>			<i>Nombre total d'« individus » observés</i>						Nombre d'organes atteints	Echelle de 0 à 4 (0: rien – 4 : fort)	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	
									Feuilles : Grappes :	Feuilles : Grappes :	



00 = A
Bourgeon
d'hiver



05 = B
Bourgeon
dans le
coton



09 = C
Pointe
verte



10 = D
Sortie
des
feuilles



12 = E
Feuilles
étalées



53 = F
Grappes
visibles



55 = G
Grappes
séparées



57 = H
Boutons
floraux
séparés



65 = I
Floraison



71 = J
Nouai-
son



75 = K
Petit pois



77 = L
Grappe
fermée



81 = M
Véraison



89 = N
Maturité



91 = O
Aoûte-
ment



93 = P
Chute
des
feuilles